

ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОЛОНОСКОПИИ/ЭНТЕРОСКОПИИ

За день до основного приема препарата для подготовки рекомендуется принять дополнительный литр выбранного препарата для подготовки.

Одноэтапная схема подготовки к колоноскопии/энтероскопии:

- колоноскопия/энтероскопия назначена до 12.00 или если пациент не может по уважительным причинам выпить вторую часть раствора в день исследования за 6 часов до процедуры; данной схемой также готовятся пациенты находящиеся на стационарном лечении;
- весь необходимый объем раствора выпивается накануне исследования вечером с 17:00 до 22:00;

- накануне дня исследования разрешён приём пищи до 12:00;

- в день исследования быть натошак - запрещено есть и пить;

- приём лекарственных препаратов по сопутствующей патологии согласовать заранее

- препараты для подготовки:

ФОРТРАНС (аналоги: Д-Форжект и Фордрайв) – 4 пакета препарата развести на 4 литра воды; выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут

МОВИПРЕП: приготовление первого литра раствора препарата - необходимо содержимое одного саше А и одного саше Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой негазированной воды комнатной температуры, довести объем раствора водой до 1 л и перемешать. Второй литр раствора готовится аналогично, используя оставшиеся саше А и саше Б. Выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500-1000 мл воды.

ЛАВАКОЛ (накануне исследования 15 пакетиков развести в 3 литрах воды и выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут с 18:00 до 22:00).

В последнем литре любого из растворов при любой схеме подготовки желательно растворить раствор эспумизана 15-30 мл (или другой аналог раствора симетикона) для уменьшения пенного компонента промывных вод в кишке.

Двухэтапная схема подготовки к колоноскопии/энтероскопии:

- если колоноскопия/энтероскопия назначена на 12.00 и позже, желательно использовать двухэтапную схему подготовки (прием последнего литра с 5.00 до 6.00 утра в день исследования).

- накануне дня исследования приём пищи разрешён до 12:00

- жидкость в течение дня накануне исследования употреблять нужно в большом количестве

- препараты для подготовки:

ФОРТРАНС (4 пакета препарата разводятся на 4 литра воды):

- 3 литра препарата выпиваются накануне дня исследования вечером с 18.00 до 22.00

- последний литр раствора препарата выпивается утром в день исследования; прием последнего стакана препарата не позднее, чем за 6 часов до исследования (с 5.00-6.00 - процедура на 12.00, с 6.00-7.00 - процедура на 13.00 и т. д.)

МОВИПРЕП:

- 1-й литр раствора + литр воды выпивается вечером накануне исследования с 19.00 до 21.00

- 2-й литр раствора + литр воды выпивается утром в день исследования; прием последнего стакана препарата не позднее, чем за 6 часов до исследования

Если исследование планируется без наркоза, то желательно использовать двухэтапную схему подготовки; прием последнего стакана препарата не позднее, чем за 6 часов до исследования.

Подготовка к ЭГДС/еюноскопии без или под анестезией

- исследование проводится строго натощак (прием жидкости разрешен только в составе схемы двухэтапной подготовки к колоноскопии, если ЭГДС и колоноскопия проводятся вместе).
- в день накануне исследования последний прием пищи до 18.00, а прием жидкости до 20.00;
- в день накануне исследования желательно не принимать в больших количествах в пищу овощи, фрукты, жирное мясо, фаст-фуд;
- лекарственные препараты по сопутствующей патологии принять не позднее чем за 6 часов до исследования или заранее согласовать их приём с лечащим врачом или с врачом-эндоскопистом