Перечень необходимых обследований для проведения колоноскопии/эзофагогастроуденоскопии/энтероскопии в условиях внутривенной анестезии и для удаления полипов/опухолей; и для бронхоскопии.

- I. Анализы (сроком не более 10 дней на момент проведения исследования):**
- 1. Общий анализ крови** (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
 - 2. Общий анализ мочи;**
 - 3. Биохимический анализ крови:** общий белок, общий и прямой билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, ферритин, С-реактивный белок, мочевины, креатинин, электролиты (Na, K, Cl, Ca, Fe);
 - 4. Коагулограмма** (АЧТВ, ТВ, ПТВ, МНО, фибриноген);
 - 5. Группа крови и резус фактор** (только оригинальные бланки с подписью и печатью!);
 - 6. Для госпитализации в стационар, удаления полипов: Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (сроком до 1 месяца).**

Анализы должны быть на отдельных бланках и заверены врачом, выполнившим исследование.

II. Обследования:

- 1. ЭКГ (сроком не более 10 дней, с заключением).**
* При наличии отклонений от нормы на ЭКГ - предоставить для сравнения в динамике ЭКГ-исследования более ранних сроков и консультация кардиолога;
- 2. Рентгенография органов грудной клетки (флюорография)**
(сроком до 1 года).
- 3. Осмотр гинеколога** сроком до 1 года (для женщин).
- 4. Функция внешнего дыхания (спирометрия)** *обязательна только перед бронхоскопией*

III. Выписка из амбулаторной карты (с заключением участкового терапевта)
(сроком до 1 месяца)

!!! Просроченные анализы или отсутствие каких-либо анализов и обследований являются причиной отказа в плановой госпитализации и причиной отказа в даче наркоза, полипэктомия выполняться не будет.

**** Дополнительно:**

1. При наличии в анамнезе острой кардиологической и/или неврологической патологии в течение последнего года – консультация кардиолога и/или невролога;
2. При наличии инсулинзависимого сахарного диабета – консультация эндокринолога для коррекции инсулинотерапии в периоперационный период (до, во время, после исследования);
3. При приеме не прямых антикоагулянтов (варфарин), новых оральных антикоагулянтов (ксарелто, прадакса), антиагрегантов (клопидогрель, тиклопидин) – консультация кардиолога/терапевта для коррекции терапии в периоперационный период;
4. **Консультация анестезиолога ГУ «РКМЦ» УД Президента РБ – при отклонениях показателей анализов от нормы и/или при неудовлетворительном общем состоянии рекомендована явка не менее чем за сутки до исследования с целью определения тактики и полноты подготовки перед исследованием, снижения риска осложнений и оценки возможности проведения наркоза (с 8.00 до 15.00 в кабинет В514).**

5. Категорически запрещено:

- **прием пищи и жидкости в день исследования;**

- в связи с остаточным влиянием применяемых лекарственных средств для анестезии, после проведения исследования в течение 24 часов управлять автотранспортом/опасными механизмами, заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания (замедляется скорость психомоторных реакций).