

Одноэтапная схема подготовки к колоноскопии/энтероскопии:

-колоноскопия/энтероскопия назначена до 10.00 или если пациент не может по уважительным причинам выпить вторую часть раствора в день исследования за 6 часов до процедуры; -весь необходимый объем раствора выпивается накануне исследования вечером с 17:00 до 22:00; -в день перед исследованием разрешен прием пищи до 12:00 (в небольшом количестве); -в день перед днем исследования быть натошак - запрещено есть и пить;

-прием лекарственных препаратов по сопутствующей патологии согласовать заранее (прием антигипертензивных, антиаритмических препаратов разрешен за 6 часов до исследования с небольшим глотком воды).

-препараты для подготовки:

ФОРТРАНС (аналоги: Д-Форжект и Фордрайв) – 4 пакета препарата развести на 4 литра воды; выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут

МОВИПРЕП: приготовление первого литра раствора препарата - необходимо содержимое одного саше А и одного саше Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой негазированной воды комнатной температуры, довести объем раствора водой до 1 л и перемешать. Второй литр раствора готовится аналогично, используя оставшиеся саше А и саше Б. Выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500-1000 мл воды.

ЛАВАКОЛ (накануне исследования 20 пакетиков развести в 4 литрах воды и выпивать по стакану приготовленного раствора каждые 10-15 минут с 18:00 до 22:00).

При использовании других препаратов руководствуйтесь прилагаемой к ним инструкцией и/или проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или врачом-эндоскопистом.

В последнем литре любого из растворов при любой схеме подготовки рекомендуется растворить раствор эспумизана 15-30 мл (или другой аналог раствора симетикона) для уменьшения пенистого компонента промывных вод в кишке.

Двухэтапная схема подготовки к колоноскопии/энтероскопии:

-если колоноскопия/энтероскопия назначена на 11.00 и позже, необходимо использовать двухэтапную схему подготовки (при времени процедуры 11.00 – прием последнего литра препарата с 4.00 до 5.00 утра; при времени процедуры на 12.00 - прием последнего литра с 5.00 до 6.00 утра в день исследования; при времени процедуры на 13.00 - прием последнего литра с 6.00 до 7.00 утра в день исследования и т.д.).

-в день перед днем исследования прием пищи разрешен до 12:00 (в небольшом количестве из разрешенных продуктов).

-в день исследования прием пищи запрещен.

-в день исследования прием раствора для подготовки с жидкостью закончить не позднее, чем за 6 часов до исследования.

-прием лекарственных препаратов по сопутствующей патологии согласовать заранее (прием антигипертензивных, антиаритмических препаратов разрешен за 6 часов до исследования с небольшим глотком воды)

-жидкость в течение дня накануне исследования употреблять нужно в большом количестве

-препараты для подготовки:

ФОРТРАНС (4 пакета препарата разводятся на 4 литра воды):

-3 литра препарата выпиваются накануне дня исследования вечером с 18.00 до 22.00

-последний литр раствора препарата выпивается утром в день исследования; прием последнего стакана препарата не позднее, чем за 6 часов до исследования (с 5.00-6.00 - процедура на 12.00, с 6.00-7.00 - процедура на 13.00 и т. д.)

МОВИПРЕП:

-1-й литр раствора + литр воды выпивается вечером накануне исследования с 19.00 до 21.00

-2-й литр раствора + литр воды выпивается утром в день исследования; прием последнего стакана препарата не позднее, чем за 6 часов до исследования

Если исследование планируется без наркоза, то желательно использовать двухэтапную схему подготовки; прием препарата следует завершить не позднее, чем за 6 часов до исследования.

Подготовка к ЭГДС/еюноскопии без или под анестезией

-исследование проводится строго натощак (прием жидкости разрешен только в составе схемы двухэтапной подготовки к колоноскопии, если ЭГДС и колоноскопия проводятся вместе).

-в день накануне исследования последний прием пищи до 18.00, а прием жидкости до 20.00;

-в день накануне исследования желательно не принимать в больших количествах в пищу овощи, фрукты, жирное мясо, фаст-фуд;

-лекарственные препараты по сопутствующей патологии принять не позднее чем за 6 часов до исследования или заранее согласовать их приём с лечащим врачом или с врачом-эндоскопистом

!!! *В последний литр любого из растворов при любой схеме подготовки (одноэтапная или двухэтапная) добавить раствор эспумизана 15-30 мл (или другой аналог раствора симетикона) для уменьшения пенного компонента остаточного содержимого в кишке.*